

BountiGel® P



GUÍA PARA EL USO DEL PRODUCTO

Modo de Aplicación: Mezclar el polvo creando una suspensión uniforme líquida



- ◆ **Al momento de surcar o en la pre-siembra:** incorpore la suspensión líquida en el suelo, utilizando un equipo convencional de aplicación de fertilizantes o pesticidas líquidos incorporados en el suelo. ❶
- ◆ **Trasplantes:** Aplicar suspensión líquida al agua de trasplante.
- ◆ **En post-plantío o post-siembra:** Inyectar la suspensión líquida una vez ya plantado/sembrado. ❷

Usos del Producto:

- ◆ **Para mejorar la germinación de la semilla:** incorpore la suspensión líquida en el suelo al nivel de la profundidad de la semilla, en la línea de siembra. ❸
- ◆ **Para mejorar la supervivencia y el establecimiento uniforme del trasplante (Tomate, Fresa, Pimientos, etc.):** incorpore la suspensión líquida en el suelo en pre-trasplante, o aplique el producto en el agua de trasplante, cerca de la zona radicular en la línea de trasplante, a aproximadamente 3-6 pulgadas de profundidad. ❹
- ◆ **Para mejorar el crecimiento de los cultivos durante el ciclo de producción:** Aplicar el producto cerca de la zona radicular en la línea de plantas, a aproximadamente 4-8 pulgadas de profundidad. ❺

Dosis de Aplicación:

- ◆ **Antes de la mezcla:** Eliminar filtros de sedimento para evitar posibles taponamientos en las líneas de aplicación.
- ◆ **Adicionar** una bolsa de 21 libras de BountiGel P (polvo) en 225 galones de agua para formar una suspensión líquida uniforme (agua con/sin fertilizante líquido). Es posible que una efervescencia natural se pueda producir cuando el producto se mezcle en una solución líquida.
- ◆ **Aplique** la suspensión líquida de Bountigel P a una dosis de 75 galones por acre tratado.



= 3 ac.
(75 gal/ac.)